张云, 赵艳菲, 王雅平, 牟彬, 张嘉越, 马浩然, 韩玉珠. 延薯4号马铃薯对氮素的生理生化响应及转录组分析 [J]. 广东农业科学, 2021, 48(2): 56-66.

延薯4号马铃薯对氮素的生理生化 响应及转录组分析

张云, 赵艳菲, 王雅平, 牟彬, 张嘉越, 马浩然, 韩玉珠

(吉林农业大学园艺学院, 吉林 长春 130118)

摘要: 【目的】研究不同氮浓度处理对马铃薯的生理生化响应以及对氮代谢相关基因的挖掘, 明确马铃薯受氮素影响的关键时期以及此时期氮代谢基因的表达差异。【方法】以“延薯4号”马铃薯为试材, 设置施氮与未施氮处理, 采用盆栽种植的方式研究马铃薯氮效率、生理生化差异以及生长发育关键时期, 并且对马铃薯现蕾期的叶和根进行转录组测序分析, 获得氮代谢差异表达基因。【结果】施氮处理显著增加了马铃薯氮效率、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、根系活力、硝酸还原酶活性、谷氨酰胺合成酶活性, 同时现蕾期为马铃薯生长发育关键时期; 施氮的叶和根中共有 12 996 个 DEGs, 其中 6 440 个上调, 6 556 个下调, GO 富集于 11 个生物过程, 17 个细胞成分和 2 个分子功能, 在氮代谢途径中共有 15 个 DEGs, 8 个上调, 7 个下调; 未施氮的叶和根中共有 12 178 个 DEGs, 其中 6 268 个上调, 5 910 个下调, GO 富集于 7 个生物过程, 21 个细胞成分和 2 个分子功能, 在氮代谢途径中共有 19 个 DEGs, 8 个上调, 11 个下调; 氮代谢途径鉴定了编码 9 种基因的 19 个 DEGs, 7 个 DEGs (PGSC0003DMG400016996, PGSC0003DMG400006913, PGSC0003DMG400030212, PGSC0003DMG400025823, PGSC0003DMG400016001, PGSC0003DMG400004355, PGSC0003DMG400009698) 在叶片中的表达量较高, 同时有 7 个 DEGs (PGSC0003DMG400015734, PGSC0003DMG400001145, PGSC0003DMG400008262, PGSC0003DMG400008356, PGSC0003DMG400014592, PGSC0003DMG400013235, Novel02273) 在根中的表达量较高。【结论】*NRT2.4*、*NRT2.5*、*NRT2.7*、*NR*、*NiR* 基因主要参与马铃薯氮素吸收功能, *GdH*、*GS*、*GOGAT* 基因主要参与马铃薯氮素利用功能。

关键词: 马铃薯; 生理响应; 转录组分析; 氮代谢

中图分类号: S532.01

文献标志码: A

文章编号: 1004-874X(2021)02-0056-11

Physiological and Biochemical Response to Nitrogen and Transcriptome Analysis in Yanshu No. 4 Potato

ZHANG Yun, ZHAO Yanfei, WANG Yaping, MOU Bin,

ZHANG Jiayue, MA Haoran, HAN Yuzhu

(College of Horticulture, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China)

Abstract: 【Objective】The study was conducted to discuss the physiological and biochemical responses of potato treated with different nitrogen concentrations and explore the genes related to nitrogen metabolism, and identify the key period when potato was affected by nitrogen and the expression differences of nitrogen metabolism genes during this period. 【Method】Taking Yanshu No. 4 potato as the test material, the nitrogen efficiency, physiological and biochemical differences as well as the key growth and development period of potato were studied by pot planting under nitrogen and non-

收稿日期: 2019-08-31

基金项目: 吉林省产业创新专项资金(201020334)

作者简介: 张云(1993—), 男, 硕士, 研究方向为蔬菜遗传育种, E-mail: 1475765530@qq.com

通信作者: 韩玉珠(1971—), 女, 博士, 教授, 研究方向为蔬菜遗传育种, E-mail: hanyzh2003@126.com

nitrogen treatments. In addition, transcriptome sequencing was performed on leaves and roots of potato at bud stage to obtain differentially expressed genes of nitrogen metabolism. 【Result】 Nitrogen treatment significantly increased potato nitrogen efficiency, soluble sugar content, soluble protein content, root activity, nitrate reductase activity and glutamine synthase activity. Meanwhile, the bud stage was a key period of potato growth and development. There were a total of 12 996 DEGs including 6 440 up-regulated and 6 556 down-regulated in leaves and roots treated with nitrogen. GO was enriched in 11 biological processes, 17 cell components and 2 molecular functions, and there were 15 DEGs including 8 up-regulated and 7 down-regulated in nitrogen metabolism pathways. There were a total of 12 178 DEGs in leaves and roots without nitrogen application, including 6 268 were up-regulated and 5 910 were down-regulated. GO was enriched in 7 biological processes, 21 cell components and 2 molecular functions, and there were 19 DEGs including 8 up-regulated and 11 down-regulated in nitrogen metabolism pathways. The nitrogen metabolism pathway identified 19 DEGs encoding 9 genes, in which 7 DEGs (PGSC0003DMG400016996, PGSC0003DMG400006913, PGSC0003DMG400030212, PGSC0003DMG400025823, PGSC0003DMG400016001, PGSC0003DMG400004355, PGSC0003DMG400009698) had high expression in leaves, meanwhile, the other 7 DEGs (PGSC0003DMG400015734, PGSC0003DMG400001145, PGSC0003DMG400008262, PGSC0003DMG400008356, PGSC0003DMG400014592, PGSC0003DMG400013235, Novel02273) had high expression in roots. 【Conclusion】 *NRT2.4*, *NRT2.5*, *NRT2.7*, *NR* and *NiR* genes are mainly involved in nitrogen absorption function of potato, while *GdH*, *GS* and *GOGAT* genes are mainly involved in nitrogen utilization function of potato.

Key words: potato; physiological response; transcriptome analysis; nitrogen metabolism

【研究意义】马铃薯 (*Solanum tuberosum* L.) 是一种重要的粮食和蔬菜作物, 氮对其生长发育具有重要意义。氮是作物生长发育所必需的重要元素, 铵盐和硝酸盐是作物氮素吸收的主要来源。氮肥可显著影响马铃薯产量, 氮素缺乏限制了马铃薯的生长^[1], 适宜的氮肥可有效提高收益率^[2], 过量的氮肥反而降低了经济和生态效益。因此, 明确延薯 4 号马铃薯受氮素影响的生理生化变化以及氮代谢相关基因的表达情况, 为其他马铃薯品种相关内容研究以及培育优质品种提供参考价值。【前人研究进展】氮肥严重影响作物生理生化响应, 可溶性糖可为植物生长发育提供足够能量, 同时也是植物体生理代谢的中间产物, 通过代谢途径合成其他物质 (如蛋白质等), 是调节植物体生殖生长与基因表达的作用因子。可溶性蛋白作为植物体重要的生理指标, 参与了多项生长过程中的物质代谢活动, 是植物体内氮素的主要存在方式, 根的生长情况和活力水平直接影响植物的营养状况以及产量水平, 硝酸还原酶 (NR) 与作物吸收利用的氮素含量有关, 施氮可显著提升作物的活性。谷氨酰胺合成酶 (GS) 是植物体内氮同化关键酶, 是氮代谢的中心枢纽, 从外界吸收的硝态氮、铵态氮, 以及固氮和氨释放均需要经过 GS 的反应途径。然而氮肥对作物产量的影响远远小于作物氮素效率的影响, 培育氮素高

效新品种是降低成本、减少环境污染、提高作物产量的有效途径。氮代谢是植物重要的生理过程之一, 是决定氮效率高的重要生理代谢过程。作物通过硝酸盐转运蛋白从外部吸收氮, 经硝酸盐和亚硝酸盐转运蛋白转化为铵盐, GS 和谷氨酸合成酶 (Glutamate synthase, GOGAT) 将转运蛋白转化为必需的氨基酸或蛋白质, 谷氨酸脱氢酶 (Glutamate dehydrogenase, GdH) 对铵盐和谷氨酸有调节作用, 这便是作物吸收氮素并进行同化利用的过程。【本研究切入点】近年来, 对作物氮素胁迫的研究成为一个热点。对于小麦^[3]、玉米^[4]、高粱^[5]、水稻^[6]等作物在氮素胁迫下的差异表达早有研究, 而对于马铃薯受氮素影响的关键生长发育时期以及此时期氮代谢基因的表达差异尚不明确。【拟解决的关键问题】延薯 4 号为马铃薯中晚熟品种, 生长势强, 根系发达, 受氮素的影响较为明显, 是氮高效品种, 为了确定不同氮水平处理下马铃薯氮效率差异的生理生化响应以及氮代谢差异基因, 我们以延薯 4 号马铃薯作为试验材料, 我们对马铃薯在施氮处理和未氮处理下的产量、含氮量、氮效率、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、根系活力、NRA, GS 活性进行测定, 发现现蕾期为马铃薯生长发育过程中受到氮素影响最明显的时期, 进而对马铃薯现蕾期的叶片和根进行转录组测序分析, 确定了参与马铃薯

氮代谢的相关基因以及表达水平的差异, 研究结果为进一步研究氮素转运机理以及培育氮素高效品种提供了重要资源。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试马铃薯品种为延薯4号, 供试肥料为尿素 ($N \geq 46\%$)、过磷酸钙 ($P_2O_5 \geq 18\%$)、硫酸钾 ($K_2O \geq 50\%$); 供试盆规格为盆底内径 22 cm, 高 25 cm, 盆口内径 30 cm; 土壤为含氮量 1.56 g/kg 的田园土, 过筛、风干后每盆装 8 kg。

1.2 试验方法

试验在吉林农业大学蔬菜基地进行。2017年 4月 25日, 采用随机区组的方式将种薯进行盆栽种植, 种植深度 6~8 cm, 设置施氮 (N、P、K) 和不施氮 (P、K) 2个处理, 每 667 m² 施肥量为纯 N 22 kg、纯 P 12 kg、纯 K 18 kg, 均一次性作底肥施入, 每个处理 30 盆, 共 60 盆。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 马铃薯生理生化分析 在马铃薯整个生育期 (苗期, 现蕾期, 块茎膨大期, 淀粉积累期, 成熟期), 使用蒽酮法测量叶片可溶性糖含量, 使用考马斯亮蓝 G-250 法测定叶片可溶性蛋白含量, 使用 TTC 法测量根系活力, 采用活体法测定叶片 NR 活性^[7], 根据田洵试验方法测量叶片 GS 活性^[8]。在马铃薯成熟期选取 3 株长势一致的马铃薯整株, 使用电子秤测量薯块重量; 使用烘干箱将叶、茎、根在 105 °C 下杀青 30 min, 85 °C 烘干至恒重, 使用电子天平测量干重; 使用粉碎机分别粉碎马铃薯叶、茎、根干样过 0.150 mm 筛, 土壤经烘干后过 0.150 mm 筛, 使用开氏消煮法消煮样品, 使用全自动凯氏定氮仪测量含氮量。

氮效率 (NUE) = 植株成熟期产量 / 土壤供

氮量

氮吸收效率 (UPE) = 植株含氮总量 / 土壤供氮量

氮利用效率 (UTE) = 植株成熟期产量 / 植株含氮总量

1.3.2 马铃薯转录组分析 在马铃薯现蕾期采集新鲜的叶和根组织, 用 DEPC 水反复冲洗, 选取 ≥ 500 mg 的叶片 (顶部开始第二叶) 和根, 用滤纸吸干水分后存放于 2 mL 冻存管中, 经液氮处理后 -80 °C 冰箱保存, 随后送至 Novogene 公司进行转录组测序。

用 Trizol 总 RNA 提取试剂盒分离各样品的总 RNA。RNA 质量的初步检测采用琼脂糖凝胶电泳, 使用 Nanodrop 检测 RNA 纯度 (OD_{260/280} 比值), 使用 Qubit 对 RNA 浓度进行精确定量, 使用 Agilent 2000 精确检测 RNA 的完整性; 同时, 计算 Q20、Q30 和 GC 含量。采用 FPKM 计算方法, 使用 HTSeq 软件对样品进行基因表达水平分析^[9], 使用 DESeq R 包对差异表达基因进行识别^[10], 使用 GOseq 软件进行 GO 富集分析^[11], 使用 KOBAS (2.0) 软件^[12] 进行 Pathway 富集分析, 使用 HemI 软件进行聚类分析。

2 结果与分析

2.1 马铃薯产量及氮效率差异

由表 1 可知, 马铃薯的含氮量以及氮效率受不同氮浓度影响。在施氮处理下, 叶、茎、根的含氮量明显高于不施氮处理, 分别为 1.39 倍、1.29 倍、1.25 倍, 总氮含量为 1.32 倍。在施氮处理下, 产量增加 13.89%, 氮吸收效率增加 19.57%, 氮利用效率降低 15.78%, 氮效率增加 3.96%。

2.2 马铃薯生理生化差异

由图 1 可知, 马铃薯可溶性糖含量、可溶性

表 1 马铃薯产量及氮效率
Table 1 Potato yield and nitrogen efficiency

处理 Treatment	含氮率 N ratio (%)			含氮量 N content (g/plant)			总氮 Total N (g/plant)	土壤氮 Soil N (g/kg)	产量 Yield (kg/plant)	氮吸收效率 UPE (kg/kg)	氮利用效率 UTE (kg/kg)	氮效率 NUE (kg/kg)
	叶 Leaf	茎 Stem	根 Root	叶 Leaf	茎 Stem	根 Root						
施氮 Nitrogen	2.20bB	1.92aA	1.10aA	0.46aA	0.45aA	0.05aA	0.95aA	1.72aA	0.41aA	0.55aA	431.58bB	238.37aA
不施氮 NO nitrogen	2.69aA	1.37bB	1.00aA	0.33bB	0.35bB	0.04aA	0.72bB	1.57bB	0.36bB	0.46bB	499.67aA	229.30bB

注: 同列数据后小写英文字母不同者表示差异显著, 大写英文字母不同者表示差异极显著。

Note: Different lowercase letters after data in the same column represent significant differences, and different capital letters represent extremely significant differences.

图 1 氮素对马铃薯生理生化的影响

Fig. 1 Effects of nitrogen on physiology and biochemistry of potato

蛋白含量、根系活力、硝酸还原酶活性、谷氨酰胺合成酶活性受不同氮浓度影响。在两种处理下，可溶性糖含量（图 1A）、根系活力（图 1C）、NRA（图 1D）、GS 活性（图 1E）均呈单峰曲线变化；可溶性蛋白含量（图 1B）在施氮处理下表现为双峰曲线变化，在未施氮处理下呈现下降趋势。同时，由于这 5 个指标均在现蕾期出现了转折性变化，本试验以部分指标与马铃薯块茎之间进行通径分析，马铃薯块茎产量与成熟期的氮吸收效率和氮利用效率、现蕾期的可溶性糖含量和可溶性蛋白含量、现蕾期的 NRA 和 GS 活性呈显著正相关，相关系数分别为 0.9692、0.8598 和 0.9396，决定系数分别为 0.9394、0.7393 和 0.7049，直接通径系数分别为 1.0356、0.4819、0.1698、0.7495、0.2452 和 0.9031。通径分析表明，块茎

产量与马铃薯成熟期的氮吸收效率和氮利用效率呈显著正相关（图 2A），与马铃薯现蕾期的可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、NRA 和 GS 活性呈显著正相关（图 2B、C）。

2.3 马铃薯转录组数据质量

转录组测序分析了马铃薯在施氮和未施氮处理的叶和根，获得 12 个 RNA-seq 文库，利用 Illumina/HiSeq TM 2000 RNA 测序平台对其中的 RNA-seq 文库进行测序。转录组测序通过对 raw reads 进行过滤得到 clean reads，占样品总读数的 92% 以上，共产生约 5 721 万个 raw reads 以及约 5 402 万个 clean reads，clean bases 在 6.75 G 左右，Q20 和 Q30 的百分比分别超过 97% 和 92%，GC 含量超过 40%（表 2），表明转录组测序数据可靠，可进行下一步的分析。

图 2 氮素对马铃薯块茎产量的通径分析

Fig. 2 Path analysis of nitrogen on potato tuber yield

表 2 马铃薯转录组数据质量汇总

Table 2 Summary of potato transcriptome data quality

样品 Sample	原始读数 Raw reads	分析读数 Clean reads	分析数据 Clean bases	错误率 Error rate (%)	Q20 (%)	Q30 (%)	GC 含量 GC content (%)
YNa1	43553516	40452950	6.07G	0.02	97.12	92.71	40.81
YNa2	49397496	47125288	7.07G	0.01	97.37	93.30	41.32
YNa3	46372144	43760828	6.56G	0.02	97.15	92.83	40.97
Ya1	46844314	43120680	6.47G	0.02	97.12	92.72	41.57
Ya2	48279028	45006728	6.75G	0.02	97.18	92.87	41.52
Ya3	50000852	47654700	7.15G	0.02	97.08	92.64	41.46
YNb1	47910752	45964542	6.89G	0.01	98.18	95.28	41.47
YNb2	41701132	39590930	5.94G	0.01	97.72	94.14	41.18
YNb3	50061142	46859126	7.03G	0.02	97.08	92.67	41.67
Yb1	47884150	46136544	6.92G	0.01	98.06	95.06	40.87
Yb2	55811914	52188706	7.83G	0.02	97.13	92.76	40.85
Yb3	44245698	42300578	6.35G	0.02	97.04	92.58	40.71

注：YNa、YNb 分别代表施氮处理下延薯 4 号叶片和根，Ya、Yb 分别代表不施氮处理下延薯 4 号叶片和根。

Note: YNa and YNb represent the leaves and roots of Yanshu No.4 potato respectively under nitrogen treatment, meanwhile, Ya and Yb represent the leaves and roots respectively under non-nitrogen treatment.

2.4 马铃薯基因差异表达分析

由图 3 可知，马铃薯在施氮处理和不施氮处理下叶和根中均存在大量差异基因。施氮处理的马铃薯叶片中共有 1 446 个差异显著基因，其中 463 个上调基因，983 个下调基因；根中共有 1 009 个差异显著基因，其中 493 个上调基因、516 个下调基因。施氮处理的马铃薯叶片和根中

共有 12 996 个差异显著基因，其中 6 440 个上调基因、6 556 个下调基因；不施氮处理的马铃薯叶片和根中共有 12 178 个差异显著基因，其中 6 268 个上调基因、5 910 个下调基因。表明氮素对马铃薯基因的表达水平有一定影响。

马铃薯氮代谢途径分析表明，植物通过 NRT 转运蛋白基因从外界吸收氮素，利用硝酸还原酶

YNa、YNb 分别代表施氮处理下延薯 4 号叶片和根，Ya、Yb 分别代表不施氮处理下延薯 4 号叶片和根。
YNa and YNb represent the leaves and roots of Yanshu No.4 potato respectively under nitrogen treatment, meanwhile Ya and Yb represent the leaves and roots of respectively under non-nitrogen treatment.

图 3 马铃薯叶片和根中差异表达基因分析

Fig. 3 Analysis of differentially expressed genes in potato leaves and roots

将硝酸盐转化成亚硝酸盐，随后经过亚硝酸还原酶转化成铵态氮，或者直接通过硝酸还原酶转换成铵态氮。铵态氮可通过 GS/GOGAT 循环途径合

成谷氨酸供植物吸收，GdH 通过 α -酮戊二酸和 NH_4^+ 转化成谷氨酸，同时在铵态氮不足时可释放 NH_4^+ 用以植物体生命活动（图 4）。

图 4 马铃薯氮代谢热图和通路分析

Fig. 4 Nitrogen metabolism heat map and pathway analysis of potato

表 3 马铃薯氮代谢差异基因表达情况
Table 3 Different gene expression in potato nitrogen metabolism

对比 Combination	基因 ID Gene ID	第一计数 Read count first	第二计数 Read count second	差异倍数 Log ₂ fold change	P 值调整 P value adjusted	功能注释 Functional annotation
YNa VS YNb	PGSC0003DMC400016996	680.9082	4.1943	7.3429	6.32E-21	硝酸盐转运蛋白 2.5
	PGSC0003DMC400006913	1504.1871	5.7356	8.0348	3.03E-05	硝酸盐转运蛋白 2.7
	PGSC0003DMC400019674	0.3149	6.7382	-4.4195	0.039345	硝酸盐转运蛋白 2.4
	PGSC0003DMC400030212	3033.5260	1584.5249	0.9369	0.003315	硝酸盐
	PGSC0003DMC400025823	637.4946	32.9731	4.2731	5.09E-06	亚硝酸盐
	PGSC0003DMC400016001	89.0340	12.8563	2.7919	2.50E-08	谷氨酸脱氢酶
	PGSC0003DMC400004355	15743.9347	96.3594	7.3522	1.40E-11	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400009698	6530.8690	738.3795	3.1448	1.57E-06	谷氨酰胺合成酶 (铁氧还蛋白)
	PGSC0003DMC400016996	896.7063	7.35791	6.9292	2.59E-27	硝酸盐转运蛋白 2.5
	PGSC0003DMC400006913	801.8732	7.7873	6.6861	0.000408	硝酸盐转运蛋白 2.7
Ya VS Yb	PGSC0003DMC400006913	3550.8635	1401.7762	1.3409	0.001799	硝酸盐
	PGSC0003DMC400025823	974.6473	25.7958	5.2397	1.36E-16	亚硝酸盐
	PGSC0003DMC400016001	108.2829	13.2394	3.0319	8.82E-06	谷氨酸脱氢酶
	PGSC0003DMC400004355	21420.6872	167.8113	6.9960	2.98E-09	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400023620	378.8765	124.6774	1.6035	5.83E-05	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400009698	5175.4360	618.3689	3.0651	3.60E-08	谷氨酰胺合成酶 (铁氧还蛋白)
	PGSC0003DMC400023620	182.7111	387.3034	-1.0839	0.024270	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400008356	4791.0345	11486.7348	-1.2616	0.001213	谷氨酸脱氢酶
	PGSC0003DMC400015734	0.3058	21.8538	-6.1591	2.47E-06	硝酸盐转运蛋白 2.4
	PGSC0003DMC400001145	0	27.3502	0.001216	0.001216	硝酸盐转运蛋白 2.4
YNa VS Ya	PGSC0003DMC400008262	444.4542	1600.7287	-1.8486	1.18E-08	亚硝酸盐
	PGSC0003DMC400008356	1142.1070	4894.9100	-2.0996	9.42E-06	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400014592	19.2920	265.0134	-3.7800	5.26E-20	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400013235	9521.0694	48591.5449	-2.3515	4.69E-14	谷氨酰胺合成酶
	Novel02273	1737.1045	29879.8899	-4.1044	8.34E-19	谷氨酰胺合成酶 (NADPH/NADH)
	PGSC0003DMC400015734	1.8722	49.1523	-4.7144	1.44E-05	硝酸盐转运蛋白 2.4
	Novel03457	0	12.1805	0.000502	0.000502	硝酸盐转运蛋白 2.4
	PGSC0003DMC400019675	0	8.4736	0.015165	0.015165	硝酸盐转运蛋白 2.4
	PGSC0003DMC400001145	0	151.6511	1.54E-08	1.54E-08	硝酸盐转运蛋白 2.4
	PGSC0003DMC400019674	1.0029	24.4133	-4.6054	4.39E-05	硝酸盐转运蛋白 2.4
YNb VS Yb	PGSC0003DMC400008262	629.0356	1495.2696	-1.2492	0.000190	亚硝酸盐
	PGSC0003DMC400008356	1348.1557	11499.7412	-3.0925	6.71E-18	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400008344	33.0194	90.5647	-1.4556	0.029054	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400014592	37.4332	248.0723	-2.7284	2.86E-11	谷氨酰胺合成酶
	PGSC0003DMC400013235	10247.4200	47606.2856	-2.2159	1.47E-11	谷氨酰胺合成酶
	Novel02273	2070.8557	25695.2297	-3.6332	2.59E-26	谷氨酰胺合成酶 (NADPH/NADH)

对马铃薯施氮与不施氮处理下叶片和根中氮代谢差异基因进行聚类分析(图4),马铃薯叶片中差异基因聚为一类,根中差异基因聚为一类。同时19个差异基因在不同类别中存在显著性差异。由表3可知,在不同处理下马铃薯叶片和根中均仅有1个下调表达基因。在施氮处理下马铃薯叶片和根中共有15个差异基因,其中8个上调表达基因,7个下调表达基因;在不施氮处理下叶片和根中共有19个差异基因,其中8个上调表达基因,11个下调表达基因。研究发现,在两种处理下,有7个差异基因在叶片中的表达量均高于根,分别为PGSC0003DMG400016996、PGSC0003DMG400006913、PGSC0003DMG400030212、PGSC0003DMG400025823、PGSC0003DMG400016001、PGSC0003DMG400004355、PGSC0003DMG400009698;同时,有7个差异基因均在根中的表达量高于叶片,分别为PGSC0003DMG400015734、PGSC0003DMG400001145、PGSC0003DMG400008262、PGSC0003DMG400008356、PGSC0003DMG400014592、PGSC0003DMG400013235、Novel02273。

3 讨论

氮是马铃薯生长发育中重要的营养元素,在生物体代谢和生化过程中起着关键作用。较低水平的氮肥会显著抑制马铃薯的可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、根系活力、NRA、GS活性,降低马铃薯各部位的含氮量以及氮效率。Illumina HiSeq 2000 测序现已成为植物转录组测序的一种有效手段,本试验表明现蕾期为马铃薯生长发育关键时期,进而对马铃薯现蕾期叶片和根进行转录组测序,探究马铃薯在施氮和不施氮下叶和根中氮代谢基因表达的差异。

3.1 马铃薯生理生化差异分析

可溶性糖在植物的整个生长过程中占有重要的位置,可以为植物的生长发育提供足够的能量,同时也是植物体生理代谢的中间产物,是调节植物体生殖生长与基因表达的作用因子,其活性的高低直接影响到植物的氮代谢能力^[13]。可溶性

蛋白作为植物体重要的生理指标,参与了多项生长过程中的物质代谢活动,是植物体内氮素的主要存在方式,是限制马铃薯生长发育以及产量形成的主要因素之一。氮处理可显著增加叶片中可溶性糖和可溶性蛋白含量,在甜菜^[14]、冬小麦^[15]、马铃薯^[16]等作物中均有所体现,与本试验结果一致。根系是植物最活跃的吸收器官和合成器官,根的生长情况和活力水平直接影响植物的营养状况以及产量水平。根系的发育与氮素吸收效率密切相关,而根系活力的强弱对氮素高效吸收有显著影响^[17],高氮使马铃薯根系活力增加,且产量有所提升。NR是植物氮代谢途径中的一种限速酶,也是高等植物中氮同化的诱导酶或适应酶,催化了植物硝酸盐-亚硝酸盐的还原过程,也就是将吸收的简单无机物在体内转换成复杂的有机物供植物吸收利用。研究发现,施用氮肥可明显提高马铃薯叶片的NRA,后期活性逐渐下降^[18],同时氮素越高GS活性越强,并且提高氮利用效率^[19],与本试验结果一致。同时本试验表明施氮处理可显著增加马铃薯各部位含氮量、氮效率以及产量,并且可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、根系活力、NRA、GS活性均在现蕾期发生明显的转折性变化,途径分析表明,块茎产量与氮吸收效率和氮利用效率呈显著正相关,与现蕾期可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、NRA、GS活性呈显著正相关。

综上所述,施氮处理可显著提高延薯4号马铃薯各项生理生化指标,同时现蕾期为马铃薯生长发育关键时期。由此本试验以现蕾期的叶片和根进行转录组测序分析,寻找其氮代谢基因的差异表达水平,从分子生物学角度阐明延薯4号马铃薯对氮素的响应差异。

3.2 马铃薯差异表达基因分析

本试验选取马铃薯在施氮和不施氮处理下现蕾期的叶片和根进行转录组测序分析,获得12个RNA-seq文库,利用Illumina/HiSeq TM 2000 测序平台对其中的RNA-seq文库进行测序。施氮处理下叶片和根中共有12996个差异表达基因,其中6440个上调基因,6556个下调基因,通过KEGG途径共鉴别出15个氮代谢差异基因,其中8个基因在叶片中表达量较高,7个基因在根中表达量较高。不施氮处理下叶片和根中共有12178个差异表达基因,其中6268个上调基

因, 5 910 个下调基因, 通过 KEGG 途径共鉴别出 19 个氮代谢差异基因, 其中 8 个基因在叶片中表达量较高, 11 个基因在根中表达量较高。在相同处理下马铃薯叶片和根中共鉴别出 19 个氮代谢差异表达基因, 其中 7 个基因在叶片中表达量较高, 分别为 PGSC0003DMG400016996 (*NRT2.5*)、PGSC0003DMG400006913 (*NRT2.7*)、PGSC0003DMG400030212 (*NR*)、PGSC0003DMG400025823 (*NiR*)、PGSC0003DMG400016001 (*GdH*)、PGSC0003DMG400004355 (*GS*)、PGSC0003DMG400009698 (*Fd-GOGAT*); 同时, 有 7 个差异基因均在根中表达量较高, 分别为 PGSC0003DMG400015734 (*NRT2.4*)、PGSC0003DMG400001145 (*NRT2.4*)、PGSC0003DMG400008262 (*NiR*)、PGSC0003DMG400008356 (*GdH*)、PGSC0003DMG400014592 (*GS*)、PGSC0003DMG400013235 (*GS*)、Novel02273 (*NADH-GOGAT*)。

在一定的氮浓度范围内, *NRT2.4* 促进了作物对氮的吸收, 同时在低氮条件下仍能提供植物所需的养分^[20], *NRT2.4* 在根表皮细胞中进行高亲和性 $\text{NO}_3\text{-N}$ 转运^[21], 本试验表明 *NRT2.4* 基因在根中的表达量高于叶片, 结果一致。在低硝酸盐的情况下, *NRT2.5* 可以促进植物体内硝酸盐的流动, 表明 *NRT2.5* 在低氮条件下表达量较高, 在过量氮浓度条件下表达量受到抑制^[22], 并且 *NRT2.5* 在不依赖 $\text{NO}_3\text{-N}$ 摄取的植物中起作用, 而在植物 $\text{NO}_3\text{-N}$ 的分布中不起作用, 优先在叶中表达的 *NRT2.5* 基因在植物生长中起到促进作用^[23]。唐贤礼等^[24]发现, *PtNRT2.7* 基因主要在叶片中表达, 并且在成熟叶片中表达量最高, 可受 $\text{NO}_3\text{-N}$ 的诱导并增强作物根系的生长。本试验得出相似结论, 即 *NRT2.5*、*NRT2.7* 基因在叶中表达量高于根。当外界硝酸盐含量过高时, *NR*、*NiR* 停止工作, 导致硝酸盐、亚硝酸盐大量累积。*NRA* 随着施氮水平的增加, 其活性会有所升高, 适量增施氮肥能有效提高作物器官的 *NRA*, 但在氮含量达到一定程度时, *NRA* 将会下降^[25]。杜永成等^[26]研究表明, 增施一定量的氮肥, *NR* 及 *NiR* 活性均有一定的提升, 且呈现双峰曲线的变化。本试验表明, *NR* 基因主要在叶片中表达,

而 *NiR* 基因在叶片和根中均有所表达。 NH_4^+ 经过 *GS/GOGAT* 作用下转变为有机态氮, 是氮同化吸收的主要过程。李楚曦^[27]研究表明, *GS* 基因过表达可以提高玉米对低氮条件胁迫的适应能力。 $\text{Glu}+\text{NH}_4^++\text{ATP} \rightarrow \text{Gln}+\text{ADP}+\text{Pi}$ 硝态氮与铵态氮都能诱导 *GS* 表达, 即吸收的氮含量越高, *GS* 活性越高。在低氮、中氮、高氮下大麦 *GS* 活性有所变化, 呈现出氮素越高 *GS* 活性越强的现象^[28]。利用 $\text{NO}_3\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、混合氮对大豆诱导, 随着氮含量不同程度的增加, *GS* 活性也相对增加, 表明 *GS* 与植株氮效率的吸收利用有重要作用^[29]。余佳玲等^[30]研究表明, 在氮素供应不足时, 植物体内 *GOGAT* 对氮素的积累以及分配、利用等方面发挥的作用较 *GS* 要高。*GOGAT* 活性随氮素水平的增加而增加, 可作为氮高效品种筛选的一项指标^[31]。*GdH* 在植株受到胁迫时发挥着重要作用, 当植株缺乏氮素时, 也可作用于谷氨酸使其氧化并释放出 NH_4^+ ^[32]。*GdH* 在外界 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 增加时, *GdH* 活性有所提升, 而在外界 $\text{NO}_3\text{-N}$ 浓度逐步增加条件下, *GdH* 活性受到短期抑制之后活性有所增加, 此时的 $\text{NO}_3\text{-N}$ 转变成 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 使得植株 *GdH* 活性发生变化^[33]。*GdH* 主要分为 *NADH-GdH* 与 *NAD⁺-GdH*, 赵双双等^[34]研究表明, 当外界氮源充足时, 植株 *NADH* 型 *GdH* 活性下降, *NAD⁺* 型 *GdH* 活性上升, 而在氮源不足时, *NADH* 与 *NAD⁺* 型 *GdH* 活性明显下调, 实现对 *N* 的吸收利用。本试验表明, *GS* 和 *GdH* 基因在叶片和根中均有所表达, 而 *Fd-GOGAT* 主要在叶中表达, *NADH-GOGAT* 主要在根中表达。

4 结论

本研究对施氮和不施氮处理下延薯4号马铃薯现蕾期叶和根进行转录组测序分析, 氮代谢途径中鉴定出编码9种基因的19个DEGs, 其中PGSC0003DMG400016996 (*NRT2.5*)、PGSC0003DMG400006913 (*NRT2.7*)、PGSC0003DMG400030212 (*NR*)、PGSC0003DMG400025823 (*NiR*)、PGSC0003DMG400016001 (*GdH*)、PGSC0003DMG400004355 (*GS*)、PGSC0003DMG400009698 (*Fd-GOGAT*) 等7个DEGs在叶片中的表达量较高, PGSC0003DMG400015734 (*NRT2.4*)、

PGSC0003DMG400001145 (*NRT2.4*)、PGSC0003DMG400008262 (*NiR*)、PGSC0003DMG400008356 (*GdH*)、PGSC0003DMG400014592 (*GS*)、PGSC0003DMG400013235 (*GS*)、Novel02273 (*NADH-GOGAT*)等7个DEGs在根中的表达量较高。本研究结果表明,*NRT2.4*、*NRT2.5*、*NRT2.7*、*NR*、*NiR*基因主要参与马铃薯氮素吸收功能,*GdH*、*GS*、*GOGAT*基因主要参与马铃薯氮素利用功能,这些基因的表达提高了马铃薯氮效率、产量,增加了植株各部位氮含量,同时使得马铃薯可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、根系活力、*NRA*、*GS*活性提高,能够进行更好的生长发育。因此了解氮高效马铃薯延薯4号的氮素作用机理以及氮代谢基因表达情况,将会为今后马铃薯氮高效品种的培育以及相关作物氮效率的研究提供理论依据。

参考文献 (References) :

- [1] WEI S, WANG X, SHI D, LI Y, ZHANG J, LIU P, ZHAO B, DONG S. The mechanisms of low nitrogen induced weakened photosynthesis in summer maize (*Zea mays* L.) under field conditions [J]. *Plant Physiol Biochem*, 2016, 105:118–128. DOI: 10.1016/j.plaphy.2016.04.007.
- [2] 杨育峰, 张晓申, 王慧瑜, 段俊枝, 李君霞, 代小冬, 杨国红. 氮肥施用量对甘薯生长、含氮量及产量的影响 [J]. *河南农业科学*, 2015, 44 (3): 52–55. DOI: 10.15933/j.cnki.1004–3268.2015.03.013
YANG Y F, ZHANG X S, WANG H Y, DOAN J Z, LI J X, DAI X D, YANG G H. Effects of Nitrogen fertilizer application amount on growth, nitrogen content and yield of sweet potato [J]. *Journal of Henan Agricultural Sciences*, 2015, 44 (3): 52–55. DOI: 10.15933/j.cnki.1004–3268.2015.03.013.
- [3] CHANDNA R, AHMAD A. Nitrogen stress-induced alterations in the leaf proteome of two wheat varieties grown at different nitrogen levels [J]. *Physiol Mol Biol Plants*, 2015, 21 (1): 19–33. DOI: 10.1007/s12298-014-0277-8.
- [4] NAZIR M, PAANDEY R, SIDDIQI T O, IBRAHIM M M, QURESHI M I, ABRAHM G, VENGAVASI K, AHMAD A. Nitrogen-deficiency stress induces protein expression differentially in low-N tolerant and low-N sensitive maize genotypes [J]. *Front Plant Sci*, 2016, 7:298. DOI: 10.3389/fpls.2016.00298.
- [5] GELLI M, DUO Y, KONDA AR, ZHANG C, HOLDING D, DWEIKAT I. Identification of differentially expressed genes between sorghum genotypes with contrasting nitrogen stress tolerance by genome-wide transcriptional profiling [J]. *BMC Genomics*, 2014, 15:179. DOI:10.1186/1471-2164-15-179.
- [6] HAKEEM K R, CHANDNA R, AHMAD A, QURESHI M I, IQBAL M. Proteomic analysis for low and high nitrogen-responsive proteins in the leaves of rice genotypes grown at three nitrogen levels [J]. *Appl Biochem Biotechnol*, 2012, 168 (4): 834–850. DOI:10.1007/s12010-012-9823-4.
- [7] 张治安, 陈展宇. 植物生理学实验技术 [M]. 长春: 吉林大学出版社, 2008.
ZHANG Z A, CHEN Z Y. Experimental techniques of plant physiology [M]. Changchun: Jilin University Press, 2008.
- [8] 田洵. 施氮量对不同马铃薯品种生长发育及氮代谢的影响 [D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2016.
TIAN X. Effects of nitrogen application on growth and nitrogen metabolism of different potato varieties [D]. Harbin: Northeast agricultural university, 2016.
- [9] ANDERS S, HUBER W. Differential expression of RNA-Seq data at the gene level—the DESeq package [J]. *Embl*, 2013, 8:1–27.
- [10] ANDER S, HUBER W. Differential expression analysis for sequence count data [J]. *Genome Biol.*, 2010, 11 (10): R106. DOI:10.1186/gb-2010-11-10-r106.
- [11] YOUNG M D, WAKEFIELD M J, SMYTH G K, OSHLACK A. Gene ontology analysis for RNA-seq: accounting for selection bias [J]. *Genome Biol.*, 2010, 11 (2): R14. DOI:10.1186/gb-2010-11-2-r14.
- [12] MAO X, AI T, OLYARCHUK J G, WEI L. Automated genome annotation and pathway identification using the KEGG Orthology (KO) as a controlled vocabulary [J]. *Bioinformatics.*, 2005, 21 (19): 3787–3793. DOI:10.1093/bioinformatics/bti430.
- [13] 王嘉佳, 唐中华. 可溶性糖对植物生长发育调控作用的研究进展 [J]. *植物学研究*, 2014, 3 (3): 71–76. DOI: 10.12677/BR.2014.33011.
WANG J J, TANG Z H. Research progress of soluble sugar on the regulation of plant growth and development [J]. *Botanical Research*, 2014, 3 (3): 71–76. DOI: 10.12677/BR.2014.33011.
- [14] 刘娜, 宋柏权, 闫志山, 范有君, 杨骥. 氮肥施用量对甜菜蔗糖代谢关键酶和可溶性糖含量的影响 [J]. *中国农学通报*, 2015, 31 (27): 183–189.
LIU N, SONG B Q, YAN Z S, FAN Y J, YANG J. Effects of nitrogen fertilizer application on sucrose metabolic key enzyme and soluble sugar content in sugar beet [J]. *Chinese Agricultural Bulletin*, 2015, 31 (27): 183–189.
- [15] 薛丽华, 赵连佳, 陈兴武, 孙诗仁, 张宏芝, 赛力汗, 雷钧杰, 张永强. 施氮量对滴灌冬小麦光合特性、产量及氮素利用效率的影响 [J]. *中国农学通报*, 2018, 34 (10): 11–16.
XUE L H, ZHAO L J, CHEN X W, SUN S R, ZHANG H Z, SAI L H, LEI J J, ZHANG Y Q. Effects of nitrogen application on photosynthetic characteristics, yield and nitrogen utilization efficiency of drip irrigation winter wheat [J]. *Chinese Agronomy Bulletin*, 2018, 34 (10): 11–16.
- [16] 张婷婷. 不同施氮水平对马铃薯氮代谢及产质量的影响 [D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2015.
ZHANG T T. Effects of different nitrogen application levels on potato carbon and nitrogen metabolism and production quality [D]. Hohhot: Inner Mongolia agricultural university, 2015.
- [17] ZHANG S L, HONG C, LI P, YUAN J C. Root vigor and kinetic

- characteristics and nitrogen use efficiencies of different potato (*Solanum tuberosum* L.) cultivars [J]. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 2016, 18 (2): 399–410.
- [18] 胡新喜, 冯艳青, 雷艳, 刘明月, 熊兴耀. 不同施氮水平下秋马铃薯的生长以及 StNR 和 StAT 的表达 [J]. *园艺学报*, 2015, 42 (10): 1974–1982.
- HU X X, FENG Y Q, LEI Y, LIU M Y, XIONG X Y. Growth of autumn potatoes and expression of StNR and StAT at different nitrogen levels [J]. *Journal of Horticulture*, 2015, 42 (10): 1974–1982.
- [19] THOMSEN H C, ERIKSSON D, MOLLER I S, SCHJOERRING J K. Cytosolic glutamine synthetase: a target for improvement of crop nitrogen use efficiency? [J]. *Trends Plant Sci.*, 2014, 19(10): 656–663. DOI: 10.1016/j.tplants.2014.06.002
- [20] XUAN H, WANG Y, WEI L. Transcription analysis of the genes encoding nitrate transporter NRT1 and NRT2 families in response to nitrogen starvation in wheat seedlings leaves [J]. *Journal of Triticeae Crops*, 2014, 34 (8): 1019–1028.
- [21] KIBA T, FERIABOURELLIER A B, LAFOUGE F. The Arabidopsis nitrate transporter NRT2.4 plays a double role in roots and shoots of nitrogen-starved plants [J]. *Plant Cell*, 2012, 24 (1): 245–258.
- [22] 冯素花. 茶树硝酸根转运蛋白 NRT1.2、NRT1.5 和 NRT2.5 基因的克隆与表达 [D]. 北京: 中国农业科学院, 2014.
- FENG S H. Cloning and expression of nitrate transporters NRT1.2, NRT1.5 and NRT2.5 genes in tea tree [D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2014.
- [23] KECHID M, DESBROSSES G, ROKHSI W. The NRT2.5 and NRT2.6 genes are involved in growth promotion of Arabidopsis by the plant growth-promoting rhizobacterium (PGPR) strain Phyllobacterium brassicacearum STM196 [J]. *New Phytologist*, 2013, 198(2): 514–524. DOI: 10.1111/nph.12158
- [24] 唐贤礼, 张月, 张盾. 毛果杨基因 *PtNRT2.7* 的功能初步鉴定与分析 [J]. *北京林业大学学报*, 2016, 38 (8): 18–27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160041.
- TANG X L, ZHANG Y, ZHANG D. Functional identification and analysis of *PtNRT2.7* gene from *Populus trichocarpa* [J]. *Journal of Beijing Forestry University*, 2016, 38 (8): 18–27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160041.
- [25] 刘鹏, 焦晓燕, 丁玉川, 武爱莲, 王劲松, 董二伟, 郭珺, 王立革. 作物氮素高效利用研究进展 [J]. *山西农业科学*, 2017, 45(5): 855–860.
- LIU P, JIAO X Y, DING Y C, WU A L, WANG J S, DONG E W, GUO J, WANG L G. Research progress on efficient utilization of nitrogen in crops [J]. *Shanxi Agricultural Science*, 2017, 45 (5): 855–860.
- [26] 杜永成, 王玉波, 范文婷. 不同氮素水平对甜菜硝酸还原酶和亚硝酸还原酶活性的影响 [J]. *植物营养与肥料学报*, 2012, 18(3): 717–723.
- DU Y C, WANG Y B, FAN W T. Effects of different nitrogen levels on nitrate reductase and nitrite reductase activity in sugar beet [J]. *Journal of Plant Nutrition and Fertilizer*, 2012, 18 (3): 717–723.
- [27] 李楚曦. 转 *Glutamine Synthetase I* 基因耐低氮玉米分子特征分析与功能效率评价 [D]. 北京: 中国农业科学院, 2016.
- LI C X. Turn *Glutamine Synthetase I* low nitrogen molecules of corn resistant gene characteristics analysis and function evaluation of efficiency [D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2016.
- [28] 强欣. 大麦不同氮利用效率品种筛选及 *GS* 基因的生物信息学分析 [D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2015.
- QIANG X. Screening of barley varieties with different nitrogen utilization efficiency and bioinformatics analysis of *GS* gene [D]. Lanzhou: Gansu Agricultural University, 2015.
- [29] 陈煜, 朱保葛, 张敬, 梁宗锁. 不同氮源对大豆硝酸还原酶和谷氨酰胺合成酶活性及蛋白质含量的影响 [J]. *大豆科学*, 2004 (2): 143–146.
- CHEN Y, ZHU B G, ZHANG J, LIANG Z S. Effects of different nitrogen sources on the activity and protein content of nitrate reductase and glutamine synthase in soybean [J]. *Soybean Science*, 2004 (2): 143–146.
- [30] 余佳玲, 朱兆坤, 张振华, 舒佳宾, 杨春, 宋海星, 官春云. 不同供氮条件下谷氨酰胺合成酶与谷氨酸合成酶对油菜氮素再利用的影响 [J]. *作物杂志*, 2014 (6): 81–85. DOI: 10.16035/j.issn.1001-7283.2014.06.017.
- YU J L, ZHU Z K, ZHANG Z H, SHU J B, YANG C, SONG H X, GUAN C Y. Effects of glutamine synthase and glutamate synthase on nitrogen reuse in rapeseed under different nitrogen supply conditions [J]. *Crop Journal*, 2014 (6): 81–85. DOI: 10.16035/j.issn.1001-7283.2014.06.017.
- [31] 陈继康, 谭龙涛, 喻春明, 朱爱国, 陈平, 王延周, 朱涛涛, 熊和平. 不同氮素水平对饲用苕麻氮代谢关键酶的影响 [J]. *草业学报*, 2017 (10): 207–218.
- CHEN J K, TAN L T, YU C M, ZHU A G, CHEN P, WANG Y Z, ZHU T T, XIONG H P. Effects of different nitrogen levels on key enzymes of nitrogen metabolism in ramie [J]. *Acta Herba Sinica*, 2017 (10): 207–218.
- [32] 潘玲玲. 黄瓜 *CsNR* 基因的克隆、遗传转化及在硝酸盐胁迫下的功能分析 [D]. 泰安: 山东农业大学, 2017.
- PAN L L. Cloning, genetic transformation and functional analysis of *CsNR* gene in cucumber under nitrate stress [D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2017.
- [33] 张国英. 不同氮素水平处理对水稻碳氮代谢关键酶 *GS* 和 *GDH* 活性及表达的影响 [D]. 福州: 福建农林大学, 2012.
- ZHANG G Y. Effects of different nitrogen levels on the activity and expression of *GS* and *GDH*, key enzymes of carbon and nitrogen metabolism in rice [D]. Fuzhou: Fujian Agriculture and Forestry University, 2012.
- [34] 赵双双, 刘雷, 何永刚, 蔡海亚, 章志宏. 氮胁迫条件下水稻理想株型基因 *ipa1* 对氮代谢的影响 [J]. *湖北农业科学*, 2017, 56 (8): 1427–1431. DOI: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.08.007.
- ZHAO S S, LIU L, HE Y G, CAI H Y, ZHANG Z H. Effects of *ipa1* gene on nitrogen metabolism of rice under nitrogen stress [J]. *Hubei Agricultural Science*, 2017, 56 (8): 1427–1431. DOI: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.08.007.